

РАЗЛИЧАВАТЕ ЛИ ВРАБЧЕТАТА?



НИЕ БРОИМ

ВРАБЧЕТАТА

16 май
2020

ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ

VRABCHETA.BG



КАМПАНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

НИЕ СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ЕДНИ ОТ ДРУГИ



НИЕ СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ЕДНИ ОТ ДРУГИ



**АЗ СЪМ
ДОМАШНО
ВРАБЧЕ**

**сиво теме и бузи
черен лигавник
сиво коремче
кафяв гръб**

НИЕ СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ЕДНИ ОТ ДРУГИ



**АЗ СЪМ
ПОЛСКО
ВРАБЧЕ**

кафява глава

**черно петно
на бузата**

светло коремче

НИЕ СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ЕДНИ ОТ ДРУГИ



АЗ СЪМ
ИСПАНСКО
ВРАБЧЕ

кафява глава
бели бузки
черни петънца
по гърба и
коремчето

Домашно врабче



Полско врабче



Испанско врабче



Дължина на тялото

14-16
см

12-14
см

14-16
см

Размах на крилата

20-22
см

20-22
см

20-22
см

Описание

Има кафяв гръб и сива долна страна на тялото. Темето е сиво, докато при останалите врабчета то е кафяво. Бузата също е сива. Мъжките са с черен нагръдник.

Най-характерният белег за вида е черното петно на бузата, каквото няма никое друго врабче. Темето и тилът са изцяло кафяви, коремът е по-светъл от този на останалите видове врабчета. Няма разлика в оперението на двата пола.

За разлика от мъжкото домашно врабче, темето е кафяво, бузата е бяла, гърлото и гушата са черни, а гърбът и страните на тялото са интензивно черно напетнени. Женските на двата вида са практически неразличими.

Различие между половете



Храна

Храни се предимно със семена на диви и културни растения и насекоми, които са важни за изхранването на малките. В градска среда яде и остатъци от зърнени храни.

Храни се основно със семена и насекоми.

Храни се основно със семена и насекоми.

Местообитания

Обитава предимно населени места, но се среща и извън тях в овощни градини, скалисти места, ивици от дървета и храсти в открити райони, изоставени сгради и

Обитава разнообразни естествени местообитания и населени места.

Обитава ивици от дървета и храсти в открити пространства, крайречни и разредени гори, дървесни плантации, скалисти райони и населени места.

Гнездене

Гнезди най-често под керемиди на покриви, кухни по сгради и улични стълбове, но също така и в хралупи на дървета, гнезда на градска лястовица и др.

Гнезди в хралупи на дървета, кухни по сгради, огради и електрически стълбове, често в малки колонии.

Гнезди на колонии по дървета, където прави топчести гнезда от трева, а също така и в гнезда на църкели.

Поколение

3 – 7 яйца
1 - 4 поколения годишно
снасят от април до август

4 – 6 яйца
2 – 3 поколения годишно
снасят от април до юли

3 – 7 яйца
1 – 2 поколения годишно
снася от април до юли

Разпространение в България

Среща се в цялата страна, с
изключение на високите части
на планините и районите без
населени места.

Среща се в цялата страна, с
изключение на най-високите
части на планините.

Среща се в равнинните и
хълмистите райони на цялата
страна, но с по-висока
численост в Югоизточна
България.

Миграция и зимуване

Постоянен вид

Постоянен вид

Зимува в
средиземноморските страни.
Пролетната миграция е през
март-април, а есенната – през
септември-октомври. Отделни
индивиди могат да останат да

Заплахи

Застрояване на зелените
площи в градовете, третиране
на парковете и градините с
пестициди, разрушаване на
гнездата при ремонт на
сгради.

Интензификация на
земеделieto, прекомерна
уплотбеба да пестициди,
премахване на синорите и
ивиците от дървета и храсти в
земеделските райони.

Интензификация на
земеделieto, прекомерна
употреба на пестициди,
премахване на синорите и
ивиците от дървета и храсти в
земеделските райони,
разораване на пасищата и
ливадите.